

Birds of the Peruvian Amazon

JUNGLE EXPERIENCES
TOUCH THE AMAZON



1. Busearellus nigricollis - The Black-collared Hawk feeds on fish, aquatic insects, and mollusks. Is found near wetland and rivers in tropical Central and South America. It is normally fairly conspicuous, perching in the open at medium heights in trees or bushes waiting to swoop down and capture a fish using its long, curved talons with toes spiked on the underside.

2. Megaceryle torquata - The breeding habitat are near large bodies of water, usually in heavily wooded areas where it finds a perch to hunt from. It is mostly a sedentary species, remaining in territories all year long. It is the biggest of the 5 species found in the Amazon.

3. Anhimia cornuta - Member of the family Anhimidae, which occurs in wetlands of tropical South America. They are related to the ducks, geese and swans. This is a massive 84-95 cm (33-38 in) long, 3.5 kg (7.7 lbs.) bird, with a small chicken-like bill. The upper parts, head and breast are black, with white speckles on the crown, throat and wing covers. There is a long spiny structure projecting forward from the crown which is used for sexual attraction.

4. Trogon melanurus - Is a canopy and mid-level forest species in lowland South America. The male has a yellow bill and reddish eye ring, a green head, chest, and upper parts with a white band separating the chest from the red under parts, and a blackish tail. Females are gray above and below save for the red belly.

5. Opisthocomus hoazin - Also known as Stink Bird, is a species found in swamps, riverine forest and mangrove of the Amazon and the Orinoco delta of South America. It is notable for having chicks that possess claws on two of their wing digits. It is the only member of the genus Opisthocomus. The taxonomic position of this family has been greatly debated, and is still far from clear. (Some experts think could be a pre-link from dinosaurs to birds).

6. Buteogallus urubitinga - Is a large black raptor widespread in the Neotropics. It has yellow legs, and a white tail that is crossed with one or two black bands. Usually is found in the vicinity of water regarding diet, feeding primarily on rodents, bats, birds, fish, crabs, reptiles, and amphibians, there are also reports of these hawks eating fruit and eggs. The Great Black-Hawk often feeds on the ground, in vegetation, or even in shallow water, pursuing prey on foot or with short flights.

7. Psarocolius angustifrons - The "Oropendola" is in the Icteridae family. It is found in wooded habitats in the highlands of the northern and central Andes, and in lowlands of the western Amazon. It is generally common and widespread. Males are larger than females, but, otherwise the genders are similar. Its plumage is mainly olive and brown, and the outer rectrices are contrastingly yellow.

8. Jacana jacana - Is a resident from South America. The jacanas are a group of wetland birds, which lays four black-marked brown eggs in a floating nest. The male takes responsibility for incubation, with two eggs held between each wing and the breast. The females are polyandrous.

9. Milvago chimachima - Is a bird of prey in the Falconidae family. It is found in tropical and subtropical South America and the southern portion of Central America, the caracara is not a fast-flying aerial hunter, but is rather sluggish and often obtains food by scavenging.

10. Tigrisoma lineatum - Related to the fascinating Tiger-heron, this heron is much more likely to see on oxbow lakes and along small streams in forested habitats. Often seen when flushed, it will at times perch in branches close to the water to catch some fish. The adult is a beautiful and finely vermiculated bird, with a rufous neck that is usually held retracted but can be extended to an astonishing length.

11. Herpethotes cachinnans - Also called the Snake Hawk, is a medium-sized bird of prey in the falcon family (Falconidae), the only member of the genus Herpethotes. This Neotropical species is a specialist snake-eater. Its common and scientific names both refer to its distinctive voice.

12. Cacicus cela - It breeds in much of northern South America from Panama and Trinidad south to Peru, Bolivia and central Brazil. However, have been sighted as far north as Nayarit, Mexico. The Yellow-rumped Cacique is a slim bird, with a long tail, blue eyes, and a pale yellow pointed bill. It has mainly black plumage, apart from a bright yellow rump.

13. Ramphastos tucanus - Like other toucans, the White-throated Toucan is brightly marked and has a huge bill. The plumage is mostly black except for a white throat and chest bordered below with a narrow red line. The rump is bright yellow and the crissum is red. The bare skin around the eye is blue. The bill has a yellow tip, upper ridge and base of the upper mandible, and the base of the lower mandible is blue. Males have larger and longer-bill than females, but otherwise the sexes are similar.

14. Ara macao - Is a large, red, yellow and blue South American parrot, a member of a large group of Neotropical parrots called macaws. It is native to humid evergreen forests of tropical South America. Range extends from extreme south-eastern Mexico to Amazonian Peru, Bolivia and Brazil in lowlands. It has suffered from local extinction through habitat destruction and capture for the parrot trade. It is the national bird of Honduras.

1. Busearellus nigricollis - Este Halcón se alimenta de peces, insectos acuáticos y moluscos. Se encuentra cerca de los humedales y los ríos en Centro y Sur América. Normalmente es bastante visible, se encarama a la intemperie en alturas medias en árboles o arbustos esperando para abalanzarse y capturar un pez con sus garras largas y curvas, con los dedos clavados en la parte inferior.

2. Megaceryle torquata - El hábitat de reproducción se encuentra cerca de grandes cuerpos de agua, por lo general en las zonas boscosas donde encuentran una rama para la caza. Es sobre todo una especie sedentaria, permaneciendo en territorio todo el año. Es el mayor de las 5 especies que se encuentran en el Amazonas.

3. Anhimia cornuta - Miembro de la familia Anhimidae, que se habita en las zonas tropicales de Sudamérica. Están relacionados con los patos, gansos y cisnes. Es un ave de 84-95 cm (33-38 pulgadas) de largo, 3,5 kg (7,7 libras.) con un pequeño pico similar al pollo. La parte superior, cabeza y pecho son de color negro, con pecas blancas sobre la corona, garganta y alas cubiertas. Tiene una estructura larga que sobresale hacia adelante desde la corona, la cual se usa para atracción sexual.

4. Trogon melanurus - Es una especie forestal de copa y nivel medio en las tierras bajas de América del Sur. El macho tiene un pico amarillo y el anillo ocular de color rojo; cabeza verde, pecho y parte superior con una banda blanca que separa el tórax del rojo debajo de las partes, y cola negruzca. Las hembras son de color gris encima y por debajo el vientre rojo.

5. Opisthocomus hoazin - También conocida como ave maloliente, es una especie que se encuentra en los pantanos, bosques ribereños y manglares del Amazonas y el delta del Orinoco en América del Sur. Se destaca por tener polluelos que poseen garras sobre dos de sus dígitos del ala. Es el único miembro del género Opisthocomus. La posición taxonómica de esta familia ha sido muy debatida, y todavía está lejos de ser clara. Algunos expertos creen que podría haber un vínculo previo de dinosaurios a las aves.

6. Buteogallus urubitinga - Es un gran negro raptor distribuido en el Neo trópico. Tiene patas amarillas, y una cola blanca que se cruza con una o dos bandas negras. Por lo general se encuentra en las proximidades de agua, alimentándose principalmente de roedores, murciélagos, aves, peces, cangrejos, reptiles y anfibios, también hay informes que estos halcones comen frutas y huevos. El grandioso halcón negro a menudo se alimenta en el suelo, en la vegetación, o incluso en aguas poco profundas, persiguiendo a su presa a pie o en vuelos cortos.

7. Psarocolius angustifrons - El "Oropendola" es de la familia Icteridae. Se encuentra en hábitats boscosos en las tierras altas del norte y centro de los Andes, y en las tierras bajas de la Amazonia occidental. En general, es común y generalizado. Los machos son más grandes que las hembras, de lo contrario los sexos son similares. Su plumaje es principalmente oliva y marrón, y las plumas externas amarillo contrastante.

8. Jacana jacana - Es un residente de América del Sur. Las jacanas son un grupo de aves de humedales, que pone cuatro huevos de color marrón marcados de negro en un nido flotante. El macho se encarga de la incubación, con dos huevos cubiertos entre cada ala y el pecho. Las hembras son poliandras.

9. Milvago chimachima - Es un ave de presa en la familia Falconidae. Se encuentra en las regiones tropicales y subtropicales de América del Sur y la parte sur de América Central. El caracara no es un cazador aéreo de vuelo rápido, pero es bastante oportunista y frecuentemente obtiene alimentos escarbando.

10. Tigrisoma lineatum - Relacionado con el fascinante Tiger-Heron, esta garza es mucho más probable que la veamos en cochas y a lo largo de pequeños arroyos en los hábitats forestales. A menudo se ve cuando brilla, a veces se cuelga en ramas cercanas al agua para pescar. El adulto es un pájaro hermoso y fino vermiculado, con un cuello marrón que se encoge generalmente, pero puede también extenderse a una longitud sorprendente.

11. Herpethotes cachinnans - También conocido como el gavilán Serpiente, es un ave de presa de tamaño mediano en la familia del halcón (Falconidae), el único miembro del género Herpethotes. Esta especie neo tropical es especialista en devorar serpientes. Sus nombres comunes y científicos se refieren tanto a su voz distintiva.

12. Cacicus cela - Se reproduce en gran parte del norte de América del Sur desde Panamá y Trinidad al sur de Perú, Bolivia y Brasil central. Sin embargo, han sido avistados hacia el norte en Nayarit, México. El Cacique Rabadilla-Amarilla es un pájaro delgado, con una cola larga, ojos azules, y un pico de color amarillo pálido. Tiene principalmente plumaje negro, aparte de una rabadilla de color amarillo brillante.

13. Ramphastos tucanus - Al igual que otros tucanes, el tucán de cuello blanco es brillante y tiene un enorme pico. El plumaje es principalmente negro excepto por una garganta blanca y el pecho bordeado con una línea roja estrecha. La rabadilla es de color amarillo brillante y el borde es rojo. La piel desnuda alrededor del ojo es de color azul. El pico tiene una punta amarilla, arista superior y la base de la mandíbula superior, y la base de la mandíbula inferior es azul. Los machos tienen más grande y largo el pico que las hembras, por lo demás los sexos son similares.

14. Ara macao - Es un loro de gran tamaño, rojo, amarillo y azul. Miembro del grupo de loros neo tropicales llamados guacamayos, es nativo de las zonas húmedas de sur América tropical. Su territorio se extiende desde el extremo sur este de México hacia la amazonia peruana, Bolivia y Brasil dentro de las tierras bajas. En la actualidad se encuentra en peligro de extinción por la destrucción de su hábitat y captura para la venta. Es el pájaro nacional de Honduras.



Birds of the Peruvian Amazon



1. *Busarellus nigricollis*



2. *Megaceryle torquata*



3. *Anhimacornuta*



4. *Trogon melanurus*



5. *Opisthocomus hoazin*



6. *Buteogallus urubitinga*




7. *Psarocolius angustifrons*



8. *Jacana jacana*



9. *Milvago chimachima*



10. *Tigrisoma lineatum*



11. *Herpetotheres cachinnans*



12. *Cacicus cela*



13. *Ramphastos tucanus*



14. *Ara macao*